



Jeden produkt. Wiele ran.

Granudacyn® to środek na bazie kwasu podchlorawego (HOCl/NaOCl), który jest stosowany do oczyszczania i nawilżania ran przewlekłych, ostrych, chirurgicznych oraz zanieczyszczonych, a także oparzeń pierwszego i drugiego stopnia.



Rany przewlekłe



Oparzenia




Rany ostre



Rany chirurgiczne


Aplikacja

Roztwór i spray do irygacji ran: do oczyszczenia ran i precyzyjnego dozowania.



1. Przełucz ranę.
- 2A. Rozpyl spray z odległości 15-30 cm na oczyszczoną ranę.
- 2B. Przyłóż do rany kompres nasączony roztworem.
3. Po oczyszczeniu rany zaaplikuj opatrunek.

Granudacyn® może być stosowany również w terapii podciśnieniowej ran.



1. Wyjmij produkt z opakowania.
2. Usuń uchwyt blokujący i przebij nakrętkę.
3. Zawieś butelkę na uchwycie na urządzeniu do wkrapiania.

	Pojemność	Kod	Okres trwałości/ Od otwarcia	Ilość w opak.
Granudacyn® Roztwór	250 ml spray	360100	30 mies./ 60 dni	15
	500 ml	360101		12
	1000 ml	360102		6
	500 ml NPWT	360103		12
	1000 ml NPWT	360104		6
Granudacyn® Żel	50 g	360107	24 mies./ 90 dni	12
	100 g spray	360108		15
	250 g spray	360106		15



Referencje: 1. Edwards-Jones V, Flanagan M, and Wolcott R. Technological advancements in the fight against antimicrobial resistance. Wounds Int 2015;6(2):47–51. 2. Severing AL, Rembe JD, Koester V, Stuermer EK. Safety and efficacy profiles of different commercial sodium hypochlorite/ hypochlorous acid solutions (NaClO/HClO): antimicrobial efficacy, cytotoxic impact and physicochemical parameters in vitro Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 74, Issue 2, February 2019, Pages 365–372. 3. RDS 005-0414, ZLG, Anleitung für die Festlegung von Mindestkriterien zur mikrobiologischen Reinheit von Medizinprodukten 4. Efficacy and safety of neutralpH superoxidised solutionin severe diabetic footinfections–Fermi´n R Marti´nez-De Jesu´s, Antonio Ramos-De la Medina, Jose´ Mari´aRemes-Troche, David G Armstrong, Stephanie C Wu, Jose Luis Lazaro Martinez, Juan V Beneit-Montesinos–International Wound Journal. 5. Granudacyn®-Journal of Wound Care Volume 29 No 10 (Suppl 2) October 2020.

Dowiedz się więcej na www.molnlycke.pl

Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Obsługa Klienta: (+48) 22 350 22 80/ biuro@molnlycke.com. Znaki firmowe, nazwy i logo Mölnlycke, są zarejestrowane globalnie w ramach grupy Mölnlycke Health Care Group of Companies® 2020. Mölnlycke Health Care AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oczyszczanie ran. Wspomaganie gojenia.¹



Granudacyn®
Kompatybilny z tkankami i bezpieczny w użyciu.



Nowe podejście do oczyszczania ran

W leczeniu ran powszechną praktyką jest ich oczyszczanie wysoce skoncentrowanymi roztworami, które mogą podrażniać skórę, co może spowolnić proces gojenia. Preparat Granudacyn® jest kompatybilny z tkankami, a jego stężenie nie podrażnia ran. Dzięki ciągłemu nawadnianiu, obciążenie mikrobiologiczne można zmniejszyć, co wspomaga gojenie się rany.

Granudacyn® to środek do oczyszczania ran – kompatybilny z tkankami i bezpieczny w użyciu.

Skuteczny i bezpieczny niezależnie od rodzaju rany

Granudacyn® to środek na bazie kwasu podchlorawego (HOCl/NaOCl), który jest stosowany do oczyszczania i nawilżania ran przewlekłych, ostrych, chirurgicznych oraz zanieczyszczonych, a także oparzeń pierwszego i drugiego stopnia.

Roztwór może być stosowany na wrażliwe tkanki takie jak chrząstki, ścięgna, więzadła i kości⁵, a także w uchu, jamie ustnej, na rany chirurgiczne (śródoperacyjne i pooperacyjne) oraz przetoki. To sprawia, że jest to najlepszy środek do oczyszczania ran w większości przypadków.

✓ Działa skutecznie na różne rodzaje ran.

Granudacyn® może być stosowany na wszystkie rany przewlekłe, w tym na odleżyny, stopę cukrzycową i owrzodzenia żyłne goleni. Dodatkowo może być stosowany na ostre i zainfekowane rany a także oparzenia pierwszego i drugiego stopnia.

✓ Udowodniona biokompatybilność

Udowodniono, że Granudacyn® jest biokompatybilny, co oznacza brak ryzyka toksycznego działania w ludzkim organizmie.²

Czystość mikrobiologiczna produktu jest pokazana przy użyciu wytycznych RDS 005³ które odnoszą się do testu obciążenia biologicznego zgodnie z normą EN ISO 11737.



✓ Zmniejsza nieprzyjemny zapach.

Oczyszczanie zmniejsza nieprzyjemny zapach z rany⁴, który jest często związany z martwiczą tkanką lub kolonizacją bakteryjną w łożysku rany.

✓ Lepsza opieka, lepsza jakość życia.

Redukcja zakażeń poprzez mechaniczne płukanie rany, wspiera naturalny proces gojenia poprawiając tym samym dobrego samopoczucia pacjenta.


✓ Długie przechowywanie. Zawsze pod ręką.

Granudacyn® można przechować w temperaturze pokojowej po otwarciu do wielokrotnego użytku do 90 dni (żel) i 60 dni (roztwór).

Wspieranie naturalnego gojenia poprzez mechaniczne płukanie i nawilżanie

Jak działa

Zaaplikuj Granudacyn® na łożysko rany przed jej oczyszczeniem. Produkt nie wymaga neutralizacji ani spltukiwania i może być stosowany do nawilżania opatrunku na ranę i nawilżania samej rany.



Granudacyn® ułatwia mechaniczne usuwanie mikroorganizmów i resztek komórek

Obecność HOCl/NaOCl w roztworze działa jako środek konserwant, zapewniając bezpieczeństwo i czystość produktu.

Testy obciążenia biologicznego, przeprowadzone zgodnie z wytycznymi RDS 005³ potwierdzają czystość mikrobiologiczną produktu



Wspomaganie leczenia

Roztwór Granudacyn® nie jest cytotoksyczny i nie powoduje podrażnień.²

Biokompatybilność

Udowodniono, że Granudacyn® jest biokompatybilny, co oznacza że ma pozytywny stosunek korzyści do ryzyka.²